


Ontwikkeling vegetatie in De Weide van Ter Heide in 2022



Het beheerplan voor dit gebied meldt het voornemen, om door middel van beheer, de vegetatie beter geschikt te maken voor broedende weidevogels. Door het stoppen van bemesting en het verhogen van het grondwaterpeil (10- 20 cm beneden maaiveld) moet dit worden bereikt. Aanpassingen van het beheer waren / zijn door de ingewikkelde pacht- / gebruiksstructuur slechts langzaam door te voeren.

Voor alle percelen geldt dat de bemesting pas met ingang van 2022 is gestopt. Met vernatten is in het Koningsdiep (p 2 t/m 11) in 2020 begonnen. Er werd toen water ingelaten, welke aanvoer regelmatig door de gebruiker van de percelen Anton Dirksen en de boswachter van SBB werd onderbroken. Pas in 2021 konden de percelen naar wens worden vernat. De andere percelen zoals de Honinghpot (p 12), de Oude land percelen (p 13, 14 en 15) en de percelen aan de Rijperdwarsweg (p 16 t/m 21) konden in 2021 niet naar wens worden beheerd.

Met ingang van voorjaar 2022 hebben wij het initiatief genomen om het water te verhogen op alle percelen (p 2 tot en met 21). Omdat diverse percelen in eigendom van SBB in de onderbemalingsgebieden van de WvTH liggen, werden deze ook vernat. Met name op de percelen aan de Rijperdwarsweg ontstond er een conflictsituatie met SBB, omdat deze de percelen te nat vond. Ons was niet verteld dat op een deel van de SBB percelen, de oude gebruiker Dirksen, nog steeds rechten had. Dat verklaarde de wens tot lagere waterpeilen.

Hoewel niet optimaal dus, kon toch in de richting van de beheerdoelen worden gewerkt.

Omdat wij eerder al de resultaten in het Koningsdiep konden bekijken (*“De vegetatie in De Weide van Ter Heide 28 juli 2020”* en *“Nogmaals de vegetatie in De Weide van Ter Heide 4 augustus 2020”*), waren wij natuurlijk razend benieuwd naar de ontwikkelingen in de vegetatie door de vernatting.

Door ervaring in het beheer van veenweiden en uit eerdere projecten was het ons bekend dat ontwikkelingen snel verwacht kunnen worden. Wel is het zo dat vegetaties met zeldzame planten pas na vele jaren van straf beheer kunnen verschijnen. Maar een afname van de biomassa is voor weidevogels al snel een grote stap in de goede richting. Deze ontwikkeling zagen we eerder in het Koningsdiep en was nu ook al binnen 1 jaar zichtbaar in de andere percelen.

De biomassa van het gemaaid grasland is helaas niet door ons gemeten. Maar volgens de loonwerker, verantwoordelijk voor maaien en afvoeren, is de biomassa met 50% of zelfs meer afgenomen. Dat mag best spectaculair genoemd worden.

Hierna laten we op perceel niveau de ontwikkeling van de vegetatie zien door middel van foto's gemaakt op 27 juni 2022.

Uitdam, 16 augustus 2022 Jan van der Geld en Ton Pieters.



Op de p 3, 4, 5 en 9 is de biomassa sterk afgenomen en wordt ook door grauwe ganzen verder kort gehouden. De ontwikkeling van mannagrass, geknikte vossenstaart, waterbies en moeraszoutgras gaat onverminderd door.



Op een aantal akkers van p 3 en 4 wordt ratelaar beeldbepalend.



Op p 11 is de bedekking met ratelaar zeer sterk toegenomen.



Op de Oude land percelen p 13, 14 en 15 is de veldzuring (in 2021 talrijk) al verdwenen. Op de natste plekken vinden we nu veel goudknopje, moerasdroogbloem, waterpeper, veenwortel en veel “natte grassen”.



P 13, 14 en 15 Op de aller natste plekken, die oppervlakkig opdrogen, veel zilverschoon.



P 13, 14 en 15 Ridderzuring houdt niet van nattigheid en is daardoor sterk afgenomen. Let op de grote oppervlakte laag blijvende grassen (vooral geknikte vossenstaart en fioringras).



P 13, 14 en 15 Langs de greppels massaal voorkomen van geknikte vossenstaart, mannagras, fioringras, waterbies, waterrus, zode-vergeet-mij-niet, waterpeper en moeraszoutgras.



P 13, 14 en 15 Langs de greppels vol water; mannagras, geknikte vossenstaart, zwanenbloem, kattenstaart, waterzuring, tandzaad, blaartrekkende boterbloem en moeraszoutgras.



Sloot tussen p 14 en 15. Het voedselrijke water (zie algenbloei) zorgt voor een eentonige begroeiing van riet, liesgras, witbolgras, harig wilgenroosje, brandnetel en moerasandoorn.



Percelen aan de Rijperdwarsweg p 16 t/m 21 Engels raaigras heeft flink in moeten leveren. Ook de witbol houdt niet van hoge waterstanden.



P 16 t/m 21 Binnen één jaar zien we sterke toename van (het op de voorgrond paars bloeiende) fioringras. Het ielere fioringras laat de biomassa sterk afnemen (al lijkt dat niet zo op de foto).